



**Certis Belchim**

GROWING TOGETHER

# DEVRINOL<sup>45 FL</sup>

**Herbicid za suzbijanje sjemenskih uskolisnih i širokolisnih korova u  
duhanu, uljanoj repici, paprici, kelju, kupusu, cvjetači, lubenici, jagodi,  
voćnjacima i vinogradima starijim od godinu dana**

Aktivna tvar: napropamid 450 g/L

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)



## Primjena i način djelovanja

DEVRINOL je zemljišni herbicid vrlo širokog spektra djelovanja za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i brojnih jednogodišnjih širokolisnih korova. DEVRINOL je registriran u kulturama u kojima je izbor raspoloživih herbicida ograničen i stoga je odličan izbor u programima suzbijanja korova u tim kultarama. DEVRINOL zajedno s drugim herbicidima omogućuje robusnu zaštitu protiv korova. DEVRINOL ima vrlo dugo djelovanje i u programima zaštite je vrlo značajan za kontrolu korova u toku cijele vegetacije. Za optimalno djelovanje potrebno je DEVRINOL plitko inkorporirati u tlo do dubine 2-5 cm. Manje doze primjenjuju se na lakšim tlima, a veće na težim tlima. DEVRINOL je učinkovit na vrlo male korove odnosno na korove u nicanju.



- Širok spektar djelovanja.
- Učinkovit u suhim i vlažnim uvjetima.
- Dobar učinak na neke korove otporne na druge herbicide (npr. bijela loboda).
- Izvrstan partner drugim herbicidima za povećanje i proširenje učinkovitosti i kontrolu otpornosti korova.
- Dobro djeluje na mnoge širokolisne i uskolisne korove: *Poa annua, Alopecurus myosuroides, Echinochloa crus-galli, Stellaria media, Thlaspi arvense, Cirsium arvense, Galium aparine, Myosotis arvensis, Fumaria officinalis, Polygonum convolvulus, Abutilon theophrasti, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus ...*

## Trojna kombinacija je najkompletnije rješenje u uljanoj repici:

- DEVRINOL 1,5 L/ha + RAPSAN 1,25 L/ha + CLEMATIS 0,25 L/ha

Dodavanje DEVRINOLA poznatoj kombinaciji za iznimno širok spektar korova i pojačano djelovanje na *Matricaria spp.*, *Apera spica-venti*, *Geranium dissectum*, *Veronica spp.*, *Papaver rhoeas*, idr.

Učinkovitost minimalno ovisi od tipa tla, vlage u tlu i kvalitete pripreme tla.

Omjer između aktivnih tvari omogućuje doze za optimalnu selektivnost uljane repice.

Uporaba isključivo prije nicanja uljane repice, nije potrebna inkorporacija.



# Primjena u kupusu, kelju i cvjetači

KULTURA	PRIJE RASAĐIVANJA	8-10 DANA NAKON PRESAĐIVANJA	2-3 TJEDNA NAKON PRESAĐIVANJA	10-14 DANA KASNIJE
KUPUS	Devrinol 2-4 L/ha (plitka inkorporacija)	Rapsan 1,5 L/ha	Lentagran 1 kg/ha +metazaklor 500 g/L-0,25 L/ha	Lentagran 1 kg/ha +metazaklor 500 g/L-0,25 L/ha
KELJ CVJETAČA			Lentagran 0,75 kg/ha +metazaklor 500 g/L-0,25 L/ha	Lentagran 0,75 kg/ha +metazaklor 500 g/L-0,25 L/ha



**LUBENICA**

- 2-4 L/ha prije sjetve ili sadnje, uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine.

**JAGODA**

- Rano u proljeće, u vrijeme mirovanja vegetacije, neposredno prije nicanja korova ili nakon što se sadnice prime, kod zasnivanja novog nasada u dozi od 3-6 L/ha.

**PAPRIKA (osim rane sorte), RAJČICA (iz presadnica)**

- 2,5-4 L/ha nakon pripreme tla za sadnju, samo u polju prije presađivanja, uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine.



## Primjena u voćnjacima i vinogradima

### VOĆNJACI i VINOGRADI stariji od jedne godine

- U proljeće, prije nicanja korova ili poslije obrade tla, uz plitku inkorporaciju u dozi od 7-10 L/ha. Sredstvo ne smije dospjeti na zelene dijelove nasada. Sredstvo je učinkovito u fazi nicanja korova.



## DUHAN

- PROIZVODNJA RASADA: prije sjetve duhana, u dozi od 3 L/ha uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine, ili odmah nakon sjetve duhana, u dozi od 4 L/ha površinskom primjenom i navodnjavanjem.
- U POLJU: prije rasađivanja u dozi od 3-5 L/ha uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine.





**Certis Belchim**  
GROWING TOGETHER

[www.CertisBelchim.hr](http://www.CertisBelchim.hr)