



Certis Belchim
GROWING TOGETHER



Fluroksipir 200 g/L



Herbicide namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu i na travnjacima



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

| Kultura | Doza L/ha |
|--|----------------------|
| Ozima pšenica i ječam | do 1 |
| Jara pšenica i ječam | do 0,75 |
| Jara zob | do 0,75 |
| Ozima zob, pšenoraž, raž, tvrda pšenica | do 1 |
| Kukuruz za silažu | do 1 |
| Uspostavljeni travnjak | do 2 |
| Novo posijani travnjaci | do 0,75 |



Flurostar[®] 200

Suzbijanje jednogodišnjih korova u žitaticama

Preporuke



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

- **OZIMA PŠENICA I JEČAM:** do 1L/ha od 2 lista do otvaranja rukavca zastavice.
- **JARA PŠENICA I JEČAM:** do 0,75 L/ha od 2 lista do izduživanja rukavca zastavice.
- **OZIMI ZOB, RAŽ, TVRDA PŠENICA I PŠENORAŽ:** do 1 L/ha od 2 lista do vidljivog drugog koljenca.


U žitaticama cjelokupni spektar širokolisnih korova proširi se s drugim herbicidima pogotovo iz skupine sulfonilureja (npr. metsulfuron, tribenuron, glavna preporuke Certis Belchima je ZEPPOS):

- Doza FLUROSTAR-a je u kombinacijama sa npr. metsulfuronom ili tribenironom 0,4-0,6 L/ha (više doze ako je glavni korov priljepača) a doza sulfonilureja pripravaka je pola do dve trećine registrirane doze.
- **Glavna preporuka (suzbijanje i širokolisnih i travnih korova): FLUROSTAR 200 0,6 L/ha + ZEPPOS 0,4-0,5 kg/ha**
- Može se kombinirati sa folijarnim graminicidima.



**FLUROSTAR 0,4-0,6 L/ha
+ ½ - ⅔ doze sulfonilureja herbicida**

FLUROSTAR 0,6 L/ha + ZEPPOS 0,4-05 kg/ha



- U žitaricama registrirana maksimalna doza FLUROSTAR-a je 0,75-1 L/ha.
- U žitaricama cjelokupni spektar širokolisnih korova Flurostaru proširi se sa drugim herbicidima pogotovo iz skupine sulfonilureja (npr. metsulfuron, tribenuron):
 - Doza FLUROSTAR-a u takvim kombinacijama 0,4-0,6 L/ha (više doze ako je glavni korov priljepača) a doza sulfonilureja pripravaka je pola do dve trećine registrirane doze. Dodavati okvašivač.
- **Glavna preporuka (širokolisni i travni korovi): FLUROSTAR 200 0,6 L/ha + ZEPPOS 0,4-05 L/ha**

- Doziranje:
 - Do 1,0 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha.
- Primjenjuje se nakon nicanja usjeva od stadija razvoja 3 lista do stadija razvoja 6 listova (BBCH 13-16). Ima dobro djelovanje i na višegodišnje širokolisne korove. FLUROSTAR je u sporedbi sa pripravcima na osnovi dikambe selektivniji za kukuruz i ekološki prihvatljiviji.



- U uspostavljenim travnjacima do 2 L/ha uz utrošak vode od 200-400 L/ha. Primjenjuje se kada trave imaju barem 3 potpuno razvijena lista, u proljeće ili na jesen.
 - Optimalna učinkovitost na kovrčavu kiselicu (*Rumex crispus*) i tupolisnu kiselicu (*Rumex obtusifolius*) postiže se u proljeće, kada se nalaze u stadiju rozete te su visine 15-20 cm.
 - Ako se sredstvo primjenjuje na korove u kasnijim stadijima razvoja, postoji mogućnost da će slijedeće sezone biti potrebno ponoviti primjenu.
 - Nakon košnje travnjaka potrebno je pričekati 2 do 3 tjedna prije primjene sredstva, kako bi se omogućio ponovni porast.
- U novozasijanim travnjacima sredstvo se primjenjuje u količini od 0,75 L/ha.

FLUROSTAR 200 djeluje vrlo brzo - prvi znakovi vidljivi su već nakon nekoliko dana.



Flurostar[®] 200 Ključne prednosti



- Sadrži najučinkovitiju aktivnu tvar za suzbijanje priljepače (*Galium aparine*).
- Vrlo je selektivan za žitarice pa se može koristiti sve do zastavičara.
- Izvrstan partner drugim herbicidima (posebno su biološki i ekonomski racionalne kombinacije sa sulfonilureja herbicidima).
- U kukuruzu odlikuje ga dobra selektivnost, ekološka prihvatljivost i djelovanje na višegodišnje korove
- Herbicid odličnog djelovanja na ključne opasne korove na travnjacima.





Certis Belchim

GROWING TOGETHER

www.CertisBelchim.hr