



Certis Belchim

GROWING TOGETHER



Neizostavna
karika u zaštiti povrća
i djtelina od korova



Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u:
brokuli, kelju, kelju pupčaru, kupusu, cvjetači, lucerni, crvenoj djtelini, češnjaku,
luku, luku kozjaku, poriluku, grašku, slanutku, leći, artičoki, šparogama, kukuruzu
šećercu, duhanu i začinskom bilju



Kontaktni herbicid za suzbijanje određenih vrsta širokolisnih korova

Aktivna tvar: piridat 450 g/kg

Formulacija: močivo prašivo (WP)





Registracija u Hrvatskoj



Kultura	Doza (L/ha)
Brokula, kelj pupičar, kupus, kelj, cvjetača Luk, poriluk, češnjak, luk kozjak Koraba Šparoga Artičoka Grah, grašak, slanutak, leća Kukuruz šećerac Lucerna, crvena djetelina Začinsko bilje	do 2 kg/ha Tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, preporučuje se koristiti u više manjih doza („split aplikacija“), no ukupna doza na sezonu ne smije biti veća od 2 kg/ha).
Duhan	do 1 kg/ha

Isključivo kontaktno delovanje

Rast korova prestaje odmah nakon prskanja



- Simptomi su vidljivi 3-4 dana nakon prskanja
- Kloroze prelaze u nekroze, korov propada

Lentagran® Spektar djelovanja



45 WP

	vrlo dobro djelovanje
	dobro djelovanje
	sporedno djelovanje
	nezadovoljivo

U povrću nema mnogo herbicida. Lentagran sam po sebi ne rješava svih problematičnih korova, ali je u kombinacijama s odgovarajućim partnerima nezaobilazna karika u zaštiti povrća od korova.

	1 kg/ha	2 kg/ha
<i>Alchemilla arvensis</i>		
<i>Amaranthus retroflexus</i>		
<i>Anthemis arvensis</i>		
<i>Atriplex sp.</i>		
<i>Capsella bursa pastoris</i>		
<i>Chenopodium album</i>		
<i>Datura stramonium</i>		
<i>Fumaria officinalis</i>		
<i>Galium aparine</i>		
<i>Galinsoga parviflora</i>		
<i>Geranium dissectum</i>		
<i>Geranium rotundifolium</i>		
<i>Lamium purpureum</i>		
<i>Convolvulus arvensis</i>		
<i>Matricaria chamomilla</i>		
<i>Papaver rhoeas</i>		
<i>Polygonum aviculare</i>		
<i>Polygonum convolvulus</i>		
<i>Polygonum lapathifolium</i>		
<i>Polygonum persicaria</i>		
<i>Senecio vulgaris</i>		
<i>Solanum nigrum</i>		
<i>Sonchus sp.</i>		
<i>Stellaria media</i>		
<i>Thlaspi arvense</i>		
<i>Urtica urens</i>		
<i>Viola arvensis</i>		
<i>Veronica persica</i>		

Lentagran je najbolje koristiti tijekom intenzivnog rasta korova u najranijim fazama od 2 do 4 prava lista korova!

Najbolja je višestruka primjena smanjenih doza na male korove do najviše ukupne sezonske doze 2 kg/ ha.

Učinkovitost od 250-500 g/ha je na korove u fazi 2-4 lista puno bolja od npr. djelovanja 1,5 kg/ha na korove veće od 6-8 listova !!!





45 WP

Opće preporuke za upotrebu

U određenim okolnostima (utjecaj sorte, vrijeme, herbicidni partner, ...) mogu se pojaviti prolazni simptomi fitotoksičnosti

- Moguća kloroza na lišću koja praktički uvijek brzo nestane i ne utječe na prinos

Fitotoksičnost je najčešće uzrokovana smanjenjem voštane prevlake na lišću kulture (obično nakon obilnih padalina)

- Prije prskanja uvijek je poželjno utvrditi stanje voštane prevlake na usjevu





45 WP

Opće preporuke za upotrebu



- Uvijek prskajte što je moguće manje korove
- Kako bi se osigurala selektivnost i učinkovitost, uvijek je bolje prskati u podijeljenim dozama
- Izbjegavajte prskanje na visokim temperaturama
- Potrošnja vode 300-400 L/ha.
- U vrijeme prskanja lišće kulture treba biti suho
- Kiša koja padne nekoliko sati nakon prskanja može smanjiti učinkovitost
- LENTAGRAN se ne smije miješati s folijarnim gnojivima, okvašivačima, pripravcima koji sadrže ulje i graminicidima
- Prskati kad je kultura dobro ukorijenjena

Lentagran®

45 WP

Primjena u luku i poriluku



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Lentagran® Preporuke

45 WP (luk, poriluk)



KULTURA	DOZE I VRIJEME UPOTREBE
Luk iz presada	Nakon presađivanja: pendimetalin CS 1,5 L/ha Nakon faze 3 lista: Lentagran 0,75-1 kg/ha + pendimetalin CS 0,5-0,7 L/ha +* 10-14 dana kasnije: Lentagran 0,75-1 kg/ha + pendimetalin CS 0,5-0,7 L/ha +*
Poriluk	Nakon presađivanja: pendimetalin CS 1,5 L/ha Nakon faze 3 lista: Lentagran 0,75-1 kg/ha + pendimetalin CS 0,5-0,7 L/ha + metazaklor 500 SC 0,75-1 L/ha +* 10-14 dana kasnije: Lentagran 0,75-1 kg/ha + pendimetalin CS 0,5-0,7 L/ha + metazaklor 500 SC 0,75-1 L/ha +*

*** Ako su prisutni specifični višegodišnji korovi (npr. slak ili osjak), dodajte smanjene osnovne doze fluroksipira i/ili preparata na bazi klopiralida.**



Lentagran®

45 WP

prije sjetve

Zemljšni herbicid
(npr. pendimetalin CS
1-1,5 L/ha)

prije nicanja
BELOUKHA
prije nicanja
na iznikle korove


Preporuke (luk, iz sjemena)



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

0,2 kg/ha
Lentagran

0,3-0,5 kg/ha
Lentagran



Herbicidni program u podijeljenim dozama:

- 1. prskanje s Lentagranom: 0,2 kg/ha, prvi list ima min 3-4 cm.
- Slijede 3-4 prskanja u dozama 0,3-0,5 kg/ha, intervali 5-7 dana.

Kombinira se s zemljšnim herbicidom (npr. pendimetalin) i po potrebi s drugim herbicidima za specifične korove (npr. fluroksipir, klopiralid).

Lentagran®

45 WP

Primjena u kupusnjačama



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Lentagran® Preporuke

45 WP (kupusnjače)



Nakon presađivanja poprskati herbicidom metazaklor 500 SC (1-1,5 L/ha). 2-3 tjedna nakon presađivanja prškanje Lentagranom s mogućim dodavanjem 0,25 l/ha metazaklor 500 SC . U slučaju prškanja u podijeljenim dozama, drugo prškanje s oba herbicida provodi se otprilike 2 tjedna kasnije ili kada dođe do naknadnog nicanja korova. Maksimalna ukupna doza Lentagrana je 2 kg/ha i metazaklora 500 SC 1,5 kg/ha.

KULTURA	DOZIRANJE	PARTNER
cvjetača, brokula, kelj	1. prškanje: 0,75 kg/ha 2. prškanje: 0,75 kg/ha ili jedno prškanje: 1,5 kg/ha	+ 0,25 l/ha metazaklor 500 SC + 0,25 l/ha metazaklor 500 SC + 0,25 l/ha metazaklor 500 SC
bijeli i crveni kupus, kelj pupčar	1. prškanje: 1 kg/ha 2. prškanje: 1 kg/ha ili jedno prškanje: 1,5-2 kg/ha	+ 0,25 l/ha metazaklor 500 SC + 0,25 l/ha metazaklor 500 SC + 0,25 l/ha metazaklor 500 SC

Lentagran®
45 WP

Certis Belchim program u praksi



Metazaklor + Lentagran (korekcija)



solo metazaklor



Lentagran®

45 WP



Lucerna, crvena djtelina



Certis Belchim
GROWING TOGETHER



Preporuke (lucerna, crvena djetelina)



- U lucerni i crvenoj djetelini Lentagran se može koristiti u razvojnoj fazi od tri razvijena lista do faze devet ili više vidljivo izduženih internodija.
- U višegodišnjim krmnim leguminozama kao što je lucerka, suzbijanje korova može biti ključna agronomска mjera u ekonomiji proizvodnje.
 - Zakoravljenost ima odlučujući utjecaj ne samo na prinos u pojedinoj godini, već i na broj godina kada još ima smisla koristiti zasijane površine.
 - Prska se nakon sjetve lucerne, kada lucerna ima potpuno razvijen prvi trolist, a korovi su mali. Preporučujemo uporabu LENTAGRANA u dozi od 1 kg/ha uz dodatak smanjenih doza herbicida na bazi imazamoksa ili bentazona. Takve kombinacije omogućuju smanjenje doza pojedinih herbicida i time smanjuju rizik od fitotoksičnosti.
 - U slučaju pojačane zakoravljenosti, ista se kombinacija može koristiti i u 2. i 3. godini, u rano proljeće, kada vegetacija tek počinje i korovi su iznikli ali su vrlo mali.

Lentagran®

45 WP

Primjena u šparogi



Certis Belchim
GROWING TOGETHER



Preporuke Šparoga

- U šparogama se tretira nakon nicanja korova nakon berbe ili prije berbe u fazi kada su izbojci još uvijek prekriveni zemljom (pazeći da Lentagran ne padne na izdanke!).
 - Lentagran se primjenjuje kada se pojave novi korovi ili jednom u dozi od 2 kg/ha, a još bolje u nižim dozama (2-3 doze 0,5-0,75 kg/ha po dozi) sprječavajući nanošenje sredstva na izdanke (vrijeme kada su izdanci prekriveni ili zaštita deflektorima).





Certis Belchim
GROWING TOGETHER

www.CertisBelchim.hr