



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

PLEDGE® 50 WP

flumioksazin 500 g/kg



Herbicid namijenjen suzbijanju korova
u vinovoj lozi, suncokretu i kukuruzu



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

PLEDGE® 50 WP

flumioksazin 500 g/kg


Iznimni spektar

i dužina djelovanja (sadrži 500 g/kg flumioksazina)



PLEDGE 50 WP se primjenjuje za suzbijanje izuzetno širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih pa i nekih uskolisnih korova. Najbolja učinkovitost postiže se kad se primjenjuje na korove koji još nisu niknuli ili su u fazi nicanja, u kasnijim fazama korova učinkovitost nije zadovoljavajuća.

PLEDGE ne ulazi u biljku već ostaje na površini i neposredno ispod površine tla gdje stvara herbicidni film koji izuzetno dugo suzbija korove koji niću. PLEDGE 50 WP stoga treba da se primjeni rano, još prije nicanja korova ili, ako su korovi već nikli, u kombinaciji sa herbicidom koji dobro djeluje na već iznikle korove.



PLEDGE® 50 WP Vinova loza: VINEPRO programi



Prije primjene sredstva PLEDGE ukloniti biljne ostatke iz vinograda. Sredstvo se primjenjuje na čistom tlu. Sredstvo se ne smije nanositi na zelene dijelove vinove loze, pa se preporuča koristiti deflektore.



Kada se PLEDGE koristi sam je doza 1,2 kg/ha* rano u proljeće prije ili neposredno nakon kretanja pupova u vinogradima starijim od 4 godine, prije nicanja korova ili najkasnije u stadiju nicanja korova.
Korekcije prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

**Doze su za neto poprskane površine, prskanjem u trake doze na hektar vinograda su $\frac{1}{4}$ do $\frac{1}{3}$ navedene doze.*

PLEDGE se može koristiti i kad su korovi već nikli ali tada da se kombinira sa herbicidom koji suzbija već iznikle korove (npr. CHIKARA, MIZUKI i BELOUKHA).

Najkompletniji spektar i dugo djelovanje postiže se kombinacijom CHIKARA + PLEDGE:

- Najbolje prskati rano u proljeće prije nicanja korova a zbog folijarnog djelovanja CHIKARE moguće i do kada korovi imaju 5-10 cm visine.
- **Doziranje:** CHIKARA 120 g/ha* + PLEDGE 600 g/ha*.
- Korekcije prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

**Doze su za neto poprskane površine, prskanjem u trake doze na hektar vinograda su ¼ do ⅓ navedene doze.*

PLEDGE® 50 WP Kukuruz

- Primjeniti u dozi od 80 g/ha **isključivo nakon sjetve, a prije nicanja** kukuruza, koji je kvalitetno i ujednačeno posijan na dubinu od najmanje 5 cm.
- Za proširenje spektra djelovanja na korove u kukuruzu može se primijeniti u kombinaciji s drugim herbicidima i to prije nicanja kukuruza u količini propisanoj u uputi na etiketi.

Velika opasnost od fitotoksičnosti ako se ne ispoštuju svi navedeni zahtjevi!



PLEDGE® 50 WP Suncokret

- Nakon sjetve **prije nicanja**: 80 g/ha suncokreta koji je kvalitetno i ujednačeno posijan na dubinu od najmanje 5 cm.
- **Kod primjene nakon nicanja suncokreta (post-em) PLEDGE 50 WP ne smije se primijeniti u stadiju samog klijanja suncokreta!**
- **Velika opasnost od fitotoksičnosti ako se ne ispoštuju svi zahtjevi!**
- Zbog vrlo velikog rizika fitotoksičnosti izbjegavati aplikaciju prije nicanja. Prikladnija je primjena u fazi 2 do najviše 4 puno razvijena lista suncokreta u dozi 80 g/ha. Takva aplikacija dopunjuje spektar i učinkovitost herbicida primjenjenih ranije i odlično suzbija korove koji niću kasnije u vegetaciji. Nikada ne primijeniti PLEDGE prije pojave 2 prava lista, niti nakon 4 prava lista suncokreta!





Certis Belchim

GROWING TOGETHER

www.CertisBelchim.hr